

ETHESAC® 48 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Ethephon.....480 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. N°: 494-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270 Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C.: 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto : 20 L
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Derivado del ácido fosfónico.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua potable o limpia, por 10 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión accidental, darle de beber agua sólo si el afectado está conciente. No inducir al vómito al menos que el médico lo indique.
 - En caso de emergencia llamar gratis a CICOTOX: 0800-1-3040.
- ESSALUD: 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ETHESAC 48 SL es un regulador de crecimiento que contiene 480 gramos de Ethephon por litro de producto comercial. ETHESAC 48 SL es un regulador sistémico que conduce y regula los procesos de maduración y coloración de los frutos por cosechar y estimula la ruptura de dormancia en semilla de papa. Para su preparación, llenar el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad del volumen, luego de agregar la cantidad de ETHESAC 48 SL requerida, rellene hasta completar el volumen total a aplicar. Hacer una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		ml/200L	o/oo		
Manzano	Estimular la maduración y color: Aplicar 2 - 3 semanas antes de la cosecha.	150	0.75	10	2
Naranja	Accelerar la coloración. Sumergir los frutos después de la cosecha por 15 segundos.	800	4.0	10	0.1
Plátano	Maduración uniforme, tratamiento por inmersión o pulverización dirigida al fruto.	300	1.5	4	2
Tomate	Estimula la maduración temprana y color. Aplicar con 5 - 15% de frutos rojos o rosados (Alta densidad de siembra).	2 - 4 L/Ha	-	7	2
Papa	Estimula la ruptura de la dormancia de la semilla. Inmersión por 5 minutos.	400 - 500	-	N.A.	0.05
Vid	Estimula la maduración de los frutos. Inmersión por 5 segundos.	400	-	14	1
Piña	Inducción de la floración.	350 - 500	-	14	2

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.
o/oo: parte por mil. N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplicar prematuramente, pues no induce a la maduración en frutos que no estén fisiológicamente maduros (Ej. Pintones o en sazón). Hacer una buena cobertura por ser producto de contacto. Realizar una aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común. No deja mal olor ni mal sabor en las cosechas. No mezclar con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

