



SENTAÍ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA  
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:  
Azoxystrobin ..... 250 g/kg  
Tebuconazole..... 500 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 3711 - SENASA

Titular del Registro:

 **MONTANA**

Importado y distribuido por:  
**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado N° 6210. Oficina 401.  
La Molina, Lima-Perú  
Teléfono: (511) 419-3000  
e-mail: info@corpmontana.com

Formulado por:  
**JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**  
7 Huanyang East Road, Jixi County  
Anhui Province, China

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 1 Kg  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección personal durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazol.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito sin supervisión médica, ni dar agua a la persona si está inconsciente o convulsiona.
  - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.
  - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
  - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
MONTANA S.A.: (01) 419-3000

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA  
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

SENTAÍ®

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SENTAÍ® es un fungicida sistémico con acción preventiva y protectora cuyos ingredientes activos tienen mecanismos de acción complementaria, el azoxystrobin inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micelial mientras que el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol esencial para la formación de las membranas celulares del hongo, lo que conlleva a su muerte.

SENTAÍ® se emplea en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido y lograr una mezcla homogénea. Aplicar con equipo en buen estado y debidamente calibrado, usando boquillas de cono hueco que produzcan gotas finas.

| “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” |                  |                               |       |        |              |              |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| CULTIVO                              | PLAGA            |                               | DOSIS |        | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|                                      | NOMBRE COMÚN     | NOMBRE CIENTÍFICO             | Kg/ha | Kg/cil |              |              |
| ESPÁRRAGO                            | “Mancha púrpura” | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.3   | -      | 40           | *0.04/**0.05 |
| CAFÉ                                 | “Roya Amarilla”  | <i>Hemileia vastatrix</i>     | -     | 0.2    | 30           | *0.03/**0.15 |
| VID                                  | “Oidium”         | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.25  | -      | 14           | *3/**0.5     |

LMR: Límite Máximo de Residuos  
\*LMR Azoxystrobin    \*\*LMR Tebuconazole  
PC: Período de Carenacia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Se deberá evaluar la incidencia y severidad de la enfermedad y las condiciones óptimas de desarrollo de estas, para proceder a la aplicación de SENTAÍ®.
- Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
- La dosis máxima a aplicar es de 0.3 kg/ha.
- De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente modo de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

SENTAÍ® es incompatible con agentes oxidantes. En caso de duda, hacer una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, de acuerdo a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

