

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR E EL PRODUCTO"
MÁNTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y YAPLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja radiación solar y

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Trasladar de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acuda a atención médica.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
- TELÉFONO BITEC AGRO SAC ☎ 961 507 749

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin
- No reutilizar los envases

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



BACITEC PLUS

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO -ACBM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis1x 10⁹ UFC/ml
 Bacillus amyloliquefaciens.....1x 10⁹ UFC/ml
 Bacillus pumilis.....1x 10⁹ UFC/ml
 Aditivos.....c.s.p 1 Kg

Reg. N° XXX -SENASA

Titular de registro: BITEC AGRO SAC

SEC. LONGAR SN (PREDIO LA HUACA) BUENA AGRICULTURA, MEJORES PRODUCTOS

☎ 961 507 749 ✉ bitecagro@gmail.com

Formulador y BITEC AGRO SAC

Distribuidor:
 SEC. LONGAR SN (PREDIO LA HUACA CON UC N° 42259) ICA
 ☎ 961 507 749 ✉ bitecagro@gmail.com BUENA AGRICULTURA, MEJORES PRODUCTOS

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido neto:1 L 5 L, 20 L, 200 L
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BACITEC PLUS, por su acción antagónica es eficaz en contra de microorganismos patógenos de las plantas, por su capacidad para producir secreciones enzimáticas tóxicas extracelulares que causan desintegración y muerte en hongos fitopatógenos, en la degradación de paredes celulares de las hifas de hongos patógenos, en la producción de químicos volátiles y antibióticos antifúngicos que inhiben hongos fitopatógenos.

PREPARACION Y APLICACIÓN: Aplicar BACITEC PLUS con equipos convencionales de aspersión terrestre. Llenar el tanque o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, luego añadir el producto a la dosis recomendada y agitar constantemente. Seguir llenando hasta se completa hasta el volumen de agua a emplear. La aplicación debe realizarse inmediatamente después de preparar la mezcla, asegurándose de realizar un buen mojado. Se recomienda ajustar el pH de la solución a 7 y utilizar un coadyuvante en la aplicación

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	3.0	N.A	N.A

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 03 aplicación de BACITEC PLUS por campaña, dependiendo de la incidencia del patógeno podría variar dicha frecuencia de aplicación

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 04 primera hora después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

BACITEC PLUS es incompatible con BACTERICIDAS sintéticos

FITOTOXICIDAD

Durante el desarrollo del ensayo se realizó el seguimiento a cualquier efecto negativo que podría causar el fungicida agrícola BACITEC PLUS al cultivo de vid, de tal manera podemos concluir que ninguno de los tratamientos y durante todas las evaluaciones efectuadas y en el transcurso del ensayo no se observaron daños y síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCION

