

# GANTRACIL VG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

Cyprodinil..... 375 g/Kg  
Fludioxonil ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

REG. PQUA N° ... - SENASA

Titular del Registro, Los Olivos de Villacuri SAC



Av. Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio Wework  
- Piso 3) Lima - Lima - San Isidro - Telf: 924851682

**Importado y Distribuido por:**

**LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.**

Av. Andres Reyes Nro. 338 Int. 120 (Edificio  
Wework - Piso 3) Lima - Lima - San Isidro -  
Telf: 924851682

**Formulado por:**

**Nanjing Loyal Chemical Co., Ltd.**

Room 1807, Building 3, No.222, Changhong Road,  
Yuhuatai District, Nanjing, China

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**5 kg**

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para los  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cyprodinil: Anilino pirimidinas; Fludioxonil: Fenilpirrol
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco,
- Si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
- En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Administrar carbón activado en abundante agua. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Acuda a un médico u hospital rápidamente

**Nota al médico:** No existen antidotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 | LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.: 955412245.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy toxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**GANTRACIL VG**, es un fungicida sistémico y de contacto compuesto de Cyprodinil que actúa interfiriendo con la biosíntesis de aminoácidos y los procesos de transporte de la membrana plasmática de los hongos y de Fludioxonil que interfiere en los mecanismos de transporte celular fúngico bloqueando la síntesis de glicerol y con ello interfiere en la germinación de esporas y desarrollo del micelio del hongo. Grupo FRAC 9 (Cyprodinil) y Grupo FRAC 12 (Fludioxonil).

**GANTRACIL VG**, se prepara, llenando el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad o 3/4 parte, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un recipiente o balde, mover hasta formar una mezcla homogénea, luego verter al tanque de aplicación y completar el agua a utilizar. Usar agua a pH 6.5.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga o cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la plaga.
- Usar la dosis mayor cuando haya mayor presión de la plaga.
- Máximo 1 aplicación por campaña/año. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

No mezcle **GANTRACIL VG**, con agentes fuertemente oxidantes, ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | ENFERMEDAD   |                         | DOSIS     | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)    |
|---------|--------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|
|         | Nombre común | Nombre Científico       | (Kg/Ha)   |              |                 |
| Vid     | Moho Gris    | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.8 - 1.0 | 5            | 3.0 *<br>2.0 ** |

\*Cyprodinil  
\*\*Fludioxonil

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

