

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# BAUPINO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Spinosad ..... 120 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**PQUA N° xxx-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 678-9544



**FORMULADOR:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.  
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
<https://www.rainbowagro.com/>

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**SOLANDINA PERU SAC**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

**Contenido neto: 20L**

Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Antes de usar el producto, cerciorarse que es el adecuado y está en perfecto estado.
- Conservar y transportar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenarlo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la casa o habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Transportar el producto en vehículos adecuados para el transporte de plaguicidas químicos y por personas entrenadas para ello.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilice equipo de protección personal durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No permitir el ingreso al área de personas que no lleven los equipos de protección adecuados.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Evitar la aplicación en áreas fuera del tratamiento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Spinosinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. no deje solo al intoxicado.
- Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- Contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico.
- NOTA AL MÉDICO: Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o tratar o cultivos aledaños.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evite la deriva por el viento
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BAUPINO** actúa tanto por ingestión como por contacto. Su modo de acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con un mecanismo único que evita la resistencia cruzada con insecticidas de otros modos de acción. Aplicado sobre el follaje se fija e incorpora a los tejidos de la planta de esta manera es protegido de la fotólisis.

**BAUPINO** produce la hiperactivación de las neuronas motores promueve la excitación de los músculos, además otros síntomas como movimiento intenso de las alas, temblores, postración. Finalmente provoca la muerte del insecto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo   | Plagas                                 |                                   | Dosis          |           | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|           | N. común                               | N. científico                     | L/Ha           | L/200L    |           |           |
| Maíz      | Gusano cogollero                       | <i>Spodoptera frugiperda</i>      | -              | 0.05-0.75 | 7         | 5         |
| Espárrago | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>        | -              | 0.1       | 1         | 0.2       |
| Arándano  | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>        | 0.225 - 0.300* | 0.075     | 3         | 0.4       |
| Vid       | Mosca mediterránea de la fruta         | <i>Ceratitis capitata</i>         | 0.53 - 0.68**  | 0.15      | 10        | 0.5       |
| Vid       | Trips del maíz                         | <i>Frankliniella occidentalis</i> | -              | 0.1       | 7         | 0.5       |
| Pimiento  | Gusano perforador de la bellota        | <i>Chloridea virescens</i>        | -              | 0.1       | 1         | 0.3       |
| Mandarina | Mosca mediterránea de la fruta         | <i>Citrus reticulata</i>          | 0.60 - 0.64*** | 0.15      | 14        | 0.3       |

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

\*: Gasto de agua: 600-800L/ha \*\*Gasto de agua: 710-900 L/Ha

\*\*\* Gasto de agua: 800-850 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga está presente.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas cuando los residuos de la pulverización estén secos.

**COMPATIBILIDAD**

Verificar previamente la compatibilidad de la mezcla con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

