

MAICERO 1 KG

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MAICERO®
750WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Nicosulfuron 750 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 3427 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

www.agrevoperuana.com

Jr. San Sebastián 298,

Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú Teléfono: (01) 6328482



Agrevo
Más valor para tu cultivo

Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.

N° 309, Changfenghe Road, Nanjing Chemical

Industrial Park, Nanjing, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 Kg

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

MAICERO 1 KG

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Sulfonylurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 6328482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MAICERO 750 WG es un herbicida selectivo en maíz. Controla gramíneas anuales y perennes, además de malezas de hoja ancha cuando es aplicado como post-emergente. Debido a que actúa principalmente por absorción foliar, no debe ser aplicado después que las malezas hayan emergido. No aplicar en plantas de maíz que tengan más de 50 cm de altura. Las malezas deben tratarse antes que compitan demasiado con el cultivo, por lo que se hace necesario aplicarlo tempranamente.

MAICERO 750 WG se prepara llenando el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad con agua; luego adicionar el producto. Complete con agua el volumen. Agite hasta que la mezcla sea homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

MAICERO 750 WG se aplica en post-emergencia, cuando el cultivo está en estadio de 2 a 6 hojas, después de la emergencia de las malezas. La aplicación debe dirigirse entre las filas cuando sea posible. Realizar como máximo 02 aplicaciones por campaña/año para el cultivo de maíz.

PERIODO DE REENTRADA:

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

MAICERO 750 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes fuertes o bases fuertes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		Dosis kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	“Cadillo”	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.05	60	0.01
	“Chamico”	<i>Datura stramonium</i>			
	“Grama”	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	“Grama dulce”	<i>Cynodon dactylon</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
	“Pega pega”	<i>Setaria verticiliata</i>			

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón - ppm) PC: Periodo de carencia

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

