

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Tóxico en caso de ingestión.
- Mortal en contacto con la piel.
- Mortal si se inhala.
- Causa irritación a la piel.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de manipular y usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

- **Establecer una zona de amortiguamiento mínima de 10 metros alrededor de cada bloque de aplicación o invernadero, desde el borde en todas las direcciones. Durante el periodo de restricción post-aplicación no deben ingresar personas ni animales.**

SOLO DEBE SER APLICADO POR PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar las lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

-En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.

-En caso de contacto con la piel: Retire inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura. Lavar la piel con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 CISPROQUIM: 080-050-847 TRICAL PERÚ S.A.C.: (01) 7842137 D.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- **TRICLOR** sólo puede ser manipulado por personal autorizado por el titular de registro.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- El envase de PEAD no es reciclable. Retornar todos los envases vacíos sin lavar a Trical Perú S.A.C. para su correcta recolección y disposición final.
- A través del sistema de inyección por espacio de 1 minuto se realizará la acción de barrido y eliminación total de **TRICLOR**.
- Los cilindros que presenten remanes deberán cerrarse sus válvulas de presurización y descarga, poner tapa gorro al cilindro metálico y enviar de regreso a las instalaciones del titular de registro para su retorno a la empresa formuladora, quien realizará la recuperación o disposición final del producto no utilizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy toxico para organismos acuáticos.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidades de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- Peligroso para abejas, artrópodos benéficos.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el campo a tratar o cultivos aledaños.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame: el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.

TRICLOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

LÍQUIDO PARA APLICACIÓN DIRECTA (AL)

Composición:

Chloropicrin1.656 g/L
Aditivosc.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del registro:
TRICAL PERÚ S.A.C.
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista



Formulador:
TRICAL SUDAMÉRICA, S.A.
Calle de Servicio Km, 103 N° 465
Comuna de Rengo, VI Región, CHILE.



Importador y Distribuidor:
TRICAL PERÚ S.A.C.
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto:
Fecha de vencimiento:

Toxico en caso de ingestión
Mortal en contacto con la Piel
Mortal si se inhala

Muy toxico para organismos
acuaticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRICLOR es un plaguicida con acción fungicida, que se emplea en el tratamiento de desinfección de suelos, para el control de hongos del suelo.

TRICLOR está dirigido a condiciones de aplicación en suelo agrícola para pre-siembra y pre-plantación de cultivos en general.

TRICLOR se usa exclusivamente sobre suelos desnudos. Antes de proceder al trasplante o siembra del cultivo, el suelo deberá estar preparado como si fuera a ser sembrado, mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente seco.

TRICLOR puede ser aplicado por Inyección al suelo a través del uso de un sistema de inyección acoplada a un tractor o por un sistema de riego poco profundo por goteo.

Para aplicación por medio de inyectores

TRICLOR puede ser aplicado como tratamiento general o en banda (por surcos), usando equipo de aplicación apropiada que asegure la colocación de **TRICLOR** por lo menos 15 a 25 cm. de profundidad en el suelo utilizando un implemento del tipo Chisel acoplado a un tractor. Realizar sellado del suelo mediante rodillo compactador inmediatamente después de la aplicación.

Para aplicación por medio de sistemas de riego por goteo

1. Para sistemas poco profundos de riego por goteo (encima de la cama o enterrados menos de 15 cm debajo de la superficie del suelo), aplíquese solamente por sistemas de riego por goteo que estén cubiertos y sellados con película de polietileno. Pruebe el sistema de riego por goteo y repare todas las fugas antes de la aplicación.
2. Riegúese el área que será tratada con suficiente agua, para que la humedad en la zona de tratamiento esté cerca de capacidad de campo. Esto debe hacerse durante un periodo de 7 - 10 días antes de la aplicación, para estimular la actividad fungosa. El suelo debe estar en buenas condiciones para sembrar, libre de terrones y materia vegetal no descompuesta.
3. Aplíquese la dosis de acuerdo al cuadro de usos.
4. Después de la aplicación de **TRICLOR**, riegue al área con suficiente agua para limpiar el sistema de riego. No permita que este producto permanezca en el sistema de riego. Deje el suelo sin perturbación durante 21 a 30 días. Luego, proceda con las actividades normales de manejo de cultivos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Suelo desnudo	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	150 L	N.A.	N.A.
	Chupadera fungosa	<i>Pythium sp.</i>		N.A.	N.A.
	Hongo cosecha	<i>Aspergillus spp.</i>		N.A.	N.A.
	Hongo cosecha	<i>Rhizopus spp.</i>		N.A.	N.A.
	Cladosporium	<i>Cladosporium sp.</i>		N.A.	N.A.
	Mancha de los frutos	<i>Penicillium sp.</i>		N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación de **TRICLOR** campaña/año en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo en suelo desnudo. El tratamiento puede realizarse en cualquier momento cuando las condiciones climáticas sean favorables. Este producto deberá ser aplicado por personal autorizado por el titular de registro.

PERIODO DE REINGRESO: No deberá haber niños, personas no autorizadas o animales dentro del área tratada por 48 horas después de la aplicación, ingresar sólo con equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD: **TRICLOR** no es compatible con otros productos, por lo que debe ser aplicado solo.

FITOTOXICIDAD: **TRICLOR** no es fitotóxico si es aplicado a suelo desnudo (de 21 a 30 días previos a la instalación de los cultivos) y si se sigue las instrucciones indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

AIREACIÓN

21 días de ventilación antes de sembrar.

SEÑALÉTICA POST APLICACIÓN

En el campo aplicado o fumigado se debe consignar obligatoriamente el siguiente aviso en Tamaño 100 x 90 cm.
Colores: amarillo Pantone 803 C, rojo Pantone 1795 C y negro Pantone 6C



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 1
EXTREMADAMENTE PELIGROSO

